

Teixeira AMFB, Knauth DR, Fachel JMG, Leal AF. Adolescentes e uso de preservativos: as escolhas dos jovens de três capitais brasileiras na iniciação e na última relação sexual. *Cad Saúde Pública* 2006; 22:1385-96.

A revista foi informada sobre erros nas Tabelas 4 e 5. As Tabelas corretas são:

The journal has been advised of errors in Tables 4 and 5. The correct tables are the following:

Tabela 4

Análise de regressão logística multinomial, ajustada, das variáveis associadas ao uso de preservativo pelos jovens de 18 a 24 anos, na primeira relação sexual, em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, Brasil, 2002 (N = 4.019).

Nível*	Homens		Mulheres	
	Preservativo OR (IC95%)	Outro método OR (IC95%)	Preservativo OR (IC95%)	Outro método OR (IC95%)
<b>1</b>				
Idade na entrevista (anos)				
Até 19	<b>1,69 (1,19-2,40)</b>	0,95 (0,42-2,13)	<b>1,69 (1,19-2,38)</b>	0,61 (0,33-1,15)
> 19	1,00	1,00	1,00	1,00
Cor				
Branca	1,21 (0,84-1,76)	0,90 (0,46-1,74)	<b>1,83 (1,37-2,43)</b>	1,53 (0,88-2,65)
Negro/Pardo	1,00	1,00	1,00	1,00
Escolaridade da mãe (anos)				
Nenhuma	1,00**	1,00	1,00**	1,00
Até 7	1,43 (0,76-2,71)	0,48 (0,21-1,09)	1,28 (0,67-2,47)	0,45 (0,17-1,20)
8-10	<b>2,62 (1,27-5,40)</b>	0,44 (0,11-1,72)	1,71 (0,81-3,61)	0,70 (0,27-1,78)
11 ou +	<b>2,63 (1,36-5,07)</b>	0,35 (0,11-1,11)	<b>2,42 (1,24-4,73)</b>	0,67 (0,28-1,63)
<b>2</b>				
Escolaridade do jovem (anos)				
Até 7	1,00	1,00	1,00**	1,00
8-10	<b>1,62 (1,09-2,41)</b>	1,38 (0,75-2,53)	<b>1,73 (1,12-2,67)</b>	1,84 (0,93-3,63)
11 ou +	1,34 (0,89-2,01)	0,69 (0,30-1,56)	<b>2,53 (1,60-3,98)</b>	5,04 (2,66-9,56)
Segue religião				
Sim	<b>1,40 (1,06-1,85)</b>	1,70 (0,80-3,61)	1,30 (0,99-1,71)	1,23 (0,79-1,93)
Não	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>3</b>				
Primeiras informações sobre contracepção com mãe				
Sim	1,49 (1,00-2,23)	1,60 (0,55-4,61)	0,97 (0,70-1,35)	0,75 (0,48-1,18)
Não	1,00	1,00	1,00	1,00
Primeiras informações sobre contracepção com pai				
Sim	<b>1,55 (1,08-2,23)</b>	1,46 (0,41-5,23)	0,97 (0,47-2,04)	0,47 (0,16-1,36)
Não	1,00	1,00	1,00	1,00
Parceiro da primeira relação sexual				
Pessoa com quem ficou/Garoto(a) de programa	1,00	1,00	1,00	1,00
Namorado(a)/Marido/Esposa/Companheiro(a)	0,76 (0,54-1,07)	1,35 (0,60-3,01)	0,83 (0,48-1,44)	1,43 (0,46-4,42)
Idade na primeira relação sexual (anos)				
Precoce (rapazes: até 14; moças: até 15)	1,00**	1,00	1,00**	1,00
Média (rapazes: 15-16; moças: 16-17)	<b>3,48 (2,31-5,22)</b>	2,41 (0,84-6,88)	1,38 (0,92-1,95)	1,34 (0,67-2,69)
Tardia (rapazes: 17-24; moças: 18-24)	<b>3,96 (2,57-6,10)</b>	3,46 (1,65-7,33)	<b>1,98 (1,24-3,17)</b>	2,30 (1,15-4,60)
Diferença etária entre parceiros				
Parceria mais jovem (2 anos e +)	1,00**	1,00	1,00	1,00
Mesma idade (entre 1 ano a - ou +)	<b>2,60 (1,30-5,20)</b>	1,06 (0,38-2,94)	0,41 (0,11-1,59)	0,25 (0,04-1,57)
Parceria mais velha (entre 2-4 anos a +)	<b>3,14 (1,40-7,06)</b>	1,57 (0,54-4,55)	0,48 (0,13-1,79)	0,37 (0,06-2,38)
Parceria muito mais velha (5 anos e +)	<b>4,44 (1,58-2,48)</b>	1,55 (0,49-4,94)	0,68 (0,18-2,58)	0,49 (0,08-2,78)
Conversaram sobre contracepção antes da primeira relação sexual				
Sim	<b>4,91(3,38-7,14)</b>	5,03 (2,10-12,02)	<b>4,36 (3,12-6,09)</b>	8,00(4,19-15,28)
Não	1,00	1,00	1,00	1,00

\* Todas as variáveis estão controladas para as demais do mesmo nível e para as dos níveis superiores. A categoria de referência do desfecho é nenhum método. As variáveis com nível de significância entre 5% e 20% foram mantidas no modelo para controle de confusão;

\*\* O teste de Wald para tendência apresentou valor  $p < 5\%$ .

Tabela 5

Análise de regressão logística multinomial, ajustada, das variáveis associadas ao uso de preservativo pelos jovens de 18 a 24 anos, na última relação sexual, em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, Brasil, 2002 (N = 3.836).

Nível*	Homens		Mulheres	
	Preservativo OR (IC95%)	Outro método OR (IC95%)	Preservativo OR(IC95%)	Outro método OR (IC95%)
<b>1</b>				
Idade na entrevista (anos)				
Até 19	1,81 (0,99-3,31)	0,88 (0,44-1,77)	1,00	1,00
> 19	1,00	1,00	1,14 (0,67-1,97)	1,97 (1,21-3,19)
Cor				
Branca	1,38 (0,85-2,25)	1,79 (1,08-2,95)	1,01 (0,68-1,50)	1,35 (0,85-2,14)
Não branca	1,00	1,00	1,00	1,00
Escolaridade materna (anos)				
Nenhuma	1,00**	1,00	1,00**	1,00
Até 7	1,46 (0,60-3,59)	1,09 (0,43-2,76)	1,99 (0,89-4,45)	1,53 (0,77-3,00)
8-10	1,61 (0,50-5,14)	1,08 (0,38-3,05)	2,45 (0,99-6,06)	1,62 (0,66-3,98)
11 ou +	2,57 (0,96-6,87)	1,84 (0,77-4,37)	<b>3,59 (1,51-8,50)</b>	1,62 (0,69-3,78)
<b>2</b>				
Escolaridade do jovem (anos)				
Até 7	1,00	1,00	1,00	1,00
8-10	0,95 (0,44-2,00)	0,71 (0,32-1,57)	1,23 (0,77-1,95)	0,92 (0,59-1,44)
11 ou +	1,41 (0,65-3,04)	1,52 (0,79-2,92)	1,71 (0,86-3,42)	1,76 (0,88-3,49)
Segue religião				
Sim	1,00	1,00	1,00	1,00
Não	0,90 (0,55-1,49)	1,19 (0,68-2,10)	1,36 (0,91-2,05)	1,20 (0,83-1,75)
Idade na primeira relação sexual (anos)				
Precoce (rapazes: até 14; moças: até 15)	1,00***	1,00	1,00***	1,00
Média (rapazes: 15-16; moças: 16-17)	0,90 (0,40-2,04)	1,11 (0,52-2,38)	<b>2,12 (1,34-3,45)</b>	1,29 (0,82-2,04)
Tardia (rapazes: 17-24; moças: 18-24)	<b>2,79 (1,29-6,01)</b>	2,21 (0,99-4,92)	1,53 (0,93-2,50)	0,82 (0,50-1,35)
Diferença etária entre parceiros				
Parceria muito mais velha (5 anos e +)	1,00	1,00	1,00	1,00
Parceria mais velha (entre 2-4 anos a +)	1,73 (0,84-3,57)	1,56 (0,74-3,27)	1,08 (0,64-1,84)	0,81 (0,42-1,54)
Mesma idade (entre 1 ano a - ou a +)	<b>2,06 (1,00-4,23)</b>	1,76 (0,86-3,61)	1,14 (0,60-2,17)	1,32 (0,72-2,41)
Parceria mais jovem (2 anos e +)	0,62 (0,24-1,69)	0,70 (0,27-1,85)	1,68 (0,39-7,25)	0,70 (0,14-3,43)
<b>4</b>				
Contraceptivo usado na primeira relação sexual				
Nenhum método	1,00***	1,00	1,00***	1,00
Outros métodos	1,81 (0,57-5,70)	2,58 (0,69-9,58)	0,55 (0,24-1,26)	1,00 (0,49-2,09)
Preservativo	<b>2,42 (1,48-3,95)</b>	1,45 (0,88-2,39)	<b>1,89 (1,16-3,09)</b>	1,15 (0,80-1,83)
<b>5</b>				
Parceiro da última relação				
Parceiro(a) atual	1,00***	1,00	1,00***	1,00
Ex-marido/Ex-esposa/Ex-namorado(a)	2,20 (0,72-6,67)	0,36 (0,15-0,89)	<b>2,01 (1,06-3,82)</b>	0,59 (0,29-1,19)
Parceiro eventual	<b>3,62 (1,60-8,16)</b>	0,11 (0,03-0,30)	<b>16,38 (4,05-66,19)</b>	1,45 (0,31-6,74)
Tempo de vida sexualmente ativa (anos)				
Até 3	1,47 (0,47-4,56)	0,67 (0,34-1,33)	1,00**	1,00
4-6	0,79 (0,45-1,41)	0,71 (0,20-2,55)	1,36 (0,70-2,65)	1,96 (1,07-3,59)
7 ou +	1,00	1,00	<b>2,37 (1,09-5,14)</b>	3,06 (1,42-6,57)
Número de parceiros sexuais na vida				
1	1,00***	1,00	<b>2,64 (1,42-4,92)</b>	2,27 (1,36-3,79)
2-4	<b>3,77 (1,23-11,51)</b>	3,47 (0,95-12,63)	<b>1,86 (1,02-3,38)</b>	1,24 (0,72-2,11)
5 ou +	2,14 (0,70-6,52)	2,11 (0,65-6,84)	1,00**	1,00

\* Todas as variáveis estão controladas para as demais do mesmo nível e para as dos níveis superiores. A categoria de referência do desfecho é nenhum método. As variáveis do 3º nível, primeiras informações sobre métodos contraceptivos com a mãe e com o pai, quem era o parceiro da primeira relação sexual e conversaram sobre contracepção antes da primeira relação sexual foram retiradas do modelo (valor  $p > 20\%$ ). Idem com tipos de trajetórias do 5º nível. Estes dados não foram apresentados na tabela acima. As variáveis com nível de significância entre 5% e 20% foram mantidas no modelo para controle de confusão;

\*\* O teste de Wald para tendência apresentou valor  $p < 5\%$ ;

\*\*\* O teste de Wald para heterogeneidade apresentou valor  $p < 5\%$ .