

de Moura Souza A, Souza BSN, Bezerra IN, Sichieri R. Impacto da redução do teor de sódio em alimentos processados no consumo de sódio no Brasil. Cad Saúde Pública 2016; 32(2):e00064615

doi: 10.1590/0102-311XER010117

A revista foi informada sobre alguns erros no artigo. As correções seguem abaixo:
The journal has been informed about some errors in the paper. The corrections are follows:
La revista fue informada sobre algunos errores en el artículo. Siguen las correcciones:

- Na página 2, segunda coluna, 6º parágrafo, linha 3, onde se lê:
Após a aplicação da redução de 25%, para o ano de 2017, a redução média estimada foi de 6,3% (Tabela 2). A redução no consumo médio de sódio foi similar entre os grupos de sexo e idade, variando de 5,6% entre homem adultos e 7,6% entre mulheres.
leia-se:
Após a aplicação da redução de 25%, para o ano de 2017, a redução média estimada foi de 9,2% (Tabela 2). A redução no consumo médio de sódio foi similar entre os grupos de sexo e idade, variando de 8,5% entre homens adultos e 10,4% entre mulheres idosas.
- Na Tabela 1, onde se lê:

Tabela 1

Teor médio de sódio no *Inquérito Nacional de Alimentação* (INA 2008-2009), teor máximo de sódio pactuado para os anos de 2013, 2016 e 2017 e percentual final de redução ao final dos cinco anos de pactuação segundo grupos de alimentos.

Grupos de alimentos	mg Na/100g				Redução (%)
	2008-2009	2013	2016	2017	
Margarina	526,0	1.089,0	715,0	-	-
Biscoito recheado	405,0	389,0	265,0	-	34,6
Queijo muçarela	415,0	-	559,0	512,0	-
Requeijão	296,0	-	587,0	541,0	-
Macarrão instantâneo	429,0	1.920,7	-	-	-
Hambúrguer	465,0	-	780,0	740,0	-
Nuggets	704,0	-	690,0	650,0	7,7
Biscoitos salgados (cream cracker)	838,0	923,0	699,0	-	16,6
Salgadinhos de milho	602,0	1.090,0	852,0	-	-
Pão de forma	537,0	645,0	522,0	-	2,8
Cereais matinais	445,0	579,0	418,0	-	6,1
Bisnaguinhas	429,0	531,0	430,0	-	-
Maionese	8.853,0	1.283,0	1.051,0	-	88,1
Presunto	1.313,0	-	1.180,0	1.160,0	11,6
Salsicha	960,0	-	1.140,0	1.120,0	-
Batatas fritas	734,0	650,0	586,0	529,0	27,9
Biscoitos doces (maisena)	394,0	419,0	359,0	-	8,9
Linguiça	1104,0	-	1.316,7	1.223,3	-
Sopas instantâneas/prontas	356,0	-	330,5	322,0	9,5
Mortadela	823,0	-	1.325,0	1.265,0	-
Pão francês	648,0	616,0	586,0	-	9,6



leia-se:

Tabela 1

Teor médio de sódio no *Inquérito Nacional de Alimentação* (INA 2008-2009), teor máximo de sódio pactuado para os anos de 2013, 2016 e 2017 e percentual final de redução ao final dos cinco anos de pactuação segundo grupos de alimentos.

Grupos de alimentos	mg Na/100g					Redução (%)
	2008-2009	2013	2016	2017		
Margarina	526,0	1.089,0	715,0	-	-	-
Biscoito recheado	405,0	389,0	265,0	-	-	34,6
Queijo muçarela	415,0	-	559,0	512,0	-	-
Requeijão	296,0	-	587,0	541,0	-	-
Macarrão instantâneo	429,0	1.920,7	-	-	-	-
Hambúrguer	465,0	-	780,0	740,0	-	-
<i>Nuggets</i>	704,0	-	690,0	650,0	-	7,7
Biscoitos salgados (<i>cream cracker</i>)	838,0	923,0	699,0	-	-	16,6
Salgadinhos de milho	602,0	1.090,0	852,0	-	-	-
Pão de forma	537,0	645,0	522,0	-	-	2,8
Cereais matinais	445,0	579,0	418,0	-	-	6,1
Bisnaguinhas	429,0	531,0	430,0	-	-	-
Maionese	853,9	-	-	-	-	-
Presunto	1.313,0	-	1.180,0	1.160,0	-	11,6
Salsicha	1.104,0	-	1.140,0	1.120,0	-	-
Batatas fritas	734,0	650,0	586,0	529,0	-	27,9
Biscoitos doces (<i>maisena</i>)	394,0	419,0	359,0	-	-	8,9
Linguiça	960,0	-	1.316,7	1.223,3	-	-
Sopas instantâneas/prontas	356,0	-	330,5	322,0	-	9,5
Mortadela	823,0	-	1.325,0	1.265,0	-	-
Pão francês	648,0	616,0	586,0	-	-	9,6

- Na Tabela 2, onde se lê:

Tabela 2

Estimativa do impacto da redução do teor de sódio em alimentos processados no consumo médio de sódio (mg/dia), erro-padrão (EP) e percentual médio de redução da ingestão de sódio em 2017, segundo sexo e faixa etária.

	2008-2009		2013		2016		2017		2017 *		Redução (%)	
	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	2017	2017 *
Total	3.163	17,0	3.153	17,0	3.120	16,9	3.116	16,8	2.965	16,1	1,5	6,3
Sexo												
Masculino												
Adolescentes	3.468	43,9	3.446	44,1	3.420	43,4	3.417	43,3	3.253	41,4	1,5	6,2
Adultos	3.628	26,5	3.615	26,5	3.582	26,3	3.578	26,3	3.424	25,3	1,4	5,6
Idosos	3.221	44,8	3.208	44,7	3.180	44,4	3.175	44,2	3.014	40,7	1,4	6,4
Feminino												
Adolescentes	2.918	33,8	2.919	33,9	2.876	33,3	2.873	33,3	2.724	31,1	1,5	6,6
Adultos	2.817	18,6	2.806	18,6	2.777	18,4	2.773	18,4	2.629	17,5	1,6	6,7
Idosos	2.647	38,4	2.635	38,3	2.605	37,1	2.599	36,9	2.447	34,8	1,8	7,6

* Aplicando redução de 25% no teor de sódio nos grupos de alimentos cujo teor máximo de sódio pactuado foi superior ao estimado no *Inquérito Nacional de Alimentação* (INA) e naqueles cujo percentual de redução foi inferior a 25%.

leia-se:

Tabela 2

Estimativa do impacto da redução do teor de sódio em alimentos processados no consumo médio de sódio (mg/dia), erro-padrão (EP) e percentual médio de redução da ingestão de sódio em 2017, segundo sexo e faixa etária.

	2008-2009		2013		2016		2017		2017 *		Redução (%)	
	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	mg/dia	EP	2017	2017 *
Total	3.163	17,0	3.153	17,0	3.120	16,9	3.116	16,8	2.871	15,9	1,5	9,2
Sexo												
Masculino												
Adolescentes	3.468	43,9	3.446	44,1	3.420	43,4	3.417	43,3	3.147	40,5	1,5	9,3
Adultos	3.628	26,5	3.615	26,5	3.582	26,3	3.578	26,3	3.318	25,0	1,4	8,5
Idosos	3.221	44,8	3.208	44,7	3.180	44,4	3.175	44,2	2.923	40,2	1,4	9,3
Feminino												
Adolescentes	2.918	33,9	2.919	33,9	2.876	33,3	2.873	33,3	2.635	30,5	1,5	9,7
Adultos	2.817	18,6	2.806	18,6	2.777	18,4	2.773	18,4	2.544	17,4	1,6	9,7
Idosos	2.647	38,5	2.635	38,3	2.605	37,1	2.599	36,9	2.372	34,6	1,8	10,4

* Aplicando redução de 25% no teor sódio nos grupos de alimentos cujo teor máximo de sódio pactuado foi superior ao estimado no *Inquérito Nacional de Alimentação* (INA) e naqueles cujo percentual de redução foi inferior a 25%.